

Table 1 : score de Buchanan-Adix modifié

Score	Sévérité du syndrome hémorragique	Description clinique
0	Absent	Asymptomatique, aucun signe hémorragique
1	Mineur	Nombre de pétéchies limité (< 100) Au maximum 5 ecchymoses de petite taille (taille ≤ 3 cm) Pas de saignement muqueux "notable" (<i>voir infra : 3a et 3b</i>)
2	Bénin	Purpura étendu : > 100 pétéchies Ou ecchymoses nombreuses (> 5) et de grande taille (> 3 cm- Pas de saignement muqueux "notable" (<i>voir infra : 3a et 3b</i>)
3a	Modéré bas-risque	Présence de sang séché (croutes) dans les narines ou pétéchies de la bouche ou de la voute du palais, ou épistaxis de durée ≤ 5 min.
3b	Modéré haut-risque	Épistaxis de durée > 5 min, ou purpura buccal symptomatique, (gênant l'alimentation ou la mastication), ou présence de bulles hémorragiques, hématurie (même microscopique), ou rectorragie, ou ménorragies significativement prolongées par rapport à la période où elle n'était pas thrombopénique ¹
4	Sévère	Saignement muqueux ou suspicion de saignement profond (SNC, poumon, muscle, articulation, ...) nécessitant une prise en charge médicale ou un geste interventionnel urgent
5	Menaçant le pronostic vital	Hémorragie intracrânienne avérée ou autre hémorragie (quel que soit le site) menaçant le pronostic vital

Adapté de Buchanan & al, J Pediatr 2002 et Schoettler & al 2017

1 : l'abondance des règles peut être quantifiée par le score de Higham (Annexe 3b).

NB1 : Dans la version originelle, il existe des scores plus précis adaptés pour chaque site anatomique (Annexe 2)

NB2 : Cette modification du score a nécessité une traduction en Français et a été adaptée par les rédacteurs de ce PNDS ; elle n'a pas fait l'objet d'une validation par une étude clinique par le CEREVANCE.